

Indications - Indicaties

Indications Type I

Intoxication au CO
Ecrasement de membres
Ostéoradionécrose
Accident de décompression
Embolie gazeuse
Infections à anaérobies

Indications Type II

Lésion sur pied diabétique
Ischémie de greffes musculocutanées
Radionécrose des tissus mous
Prévention d'ostéo-radionécrose
Surdité brutale
Ulcères ischémiques
Osteomyélite chronique
Neuroblastome Stage IV

Indications Type III

Lésions de reperfusion
Brûlures >20%
Ischémie ophtalmologique aiguë
Pneumatosis Cystoides Intestinalis
Autres plaies en retard de cicatrisation



Type I indicaties

CO-intoxicatie
Crush-syndroom
Osteoradionecrose
Decompressie-ongeval
Gas- en lucht embolie
Anaerobe Infecties

Type II indicaties

Diabetische voetwonde
Ischemie bij musculocutane enten
Weke delen radionecrose
Preventie van osteoradionecrose
Plotse doofheid
Ischemische ulcera
Chronische osteomyelitis
Neuroblastoma Stage IV

Type III indicaties

Reperfusieletsel
Brandwonden >20%
Acute ophtalmologische ischemie
Pneumatosis Cystoides Intestinalis
Andere chronische niet-helende wonden

